


داروهای تنفسی

آنتی هیستامین ها و فراورده

های ضد سرماخوردگی

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام جهت ارتباط @noori_a

داروهای متیل زانتین



استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام جهت ارتباط @noori_a

**برند های ترکیبی سالبوتامول (SABA) و
ایپراتروپیوم (آنتی کلیرنژیک) بصورت
نبولایزر و MDI در بازار دارویی ایران**



نام ژنریک : Salbutamol

نام تجاری : Ventolin®, Ventalex®

دسته دارویی : ضد آسم و تنگی نفس

دسته فارماکولوژیک / شیمیایی :

کامبیونت (فرانسه) نبولایزر و MDI

دانولین (هند) نبولایزر




کامبی پراسال (اسپانیا) نبولایزر

بتا ۲ آگونیست (سمپاتومیمتیک) انتخابی ++++ برای بتا ۲ و + برای بتا ۱ کوتاه اثر و شروع اثر سریع نیمه عمر کوتاه دارد.

شکل دارویی : شربت ۲ میلی گرم / ۵ سی سی ، قرص ۲ میلی گرم (فرم خوراکی

برای کنترل علائم در بین حملات) ، اسپری استنشاقی ۱۰۰ میکروگرم (۰.۱ میلی گرم)

، تزرقی ۰.۵ میلی گرمی و نبولایزر (بخور)



نام برندها:

اسپری ترکیبی با (IPRAVENT 20 HFA®, IPRATREX-S®, تزرقی و بخور) VENTOLIN®

(بخور و اسپری) ASTHALIN®, (ایپراتروپیوم

و COMBIVENT®, SALBUTREX®, DUOLIN® و VENTALEX® (بخور ترکیبی با ایپراتروپیوم)

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام جهت ارتباط @noori_a

**اسپیری های تیوتروپیوم موجود در بازار
دارویی ایران:**



نام ژنریک : Tiotropium

نام تجاری : Spiriva® و KP-Tiova®


دسته دارویی : ضد آسم و تنگی نفس



دسته فارماکولوژیک / شیمیایی : آنتی کولینرژیک و برونکودیلاتور بیشتر به صورت رقابتی و برگشت پذیر M3 را مهار می کند. { M1 باعث افزایش تون کولینرژیک ، M2 نقش تنظیمی در آزاد شدن Ach ، M3 موجب برونکواسپاسم و ترشح خلط می شود } این دارو به هر ۳ متصل می شود ولی خیلی سریع از M2 جدا و آهسته از M1 و M3 جدا می شود



شکل دارویی : کپسول استنشاقی ۰.۱۸ میکروگرم/دوز



کاربرد : درمان نگهدارنده COPD به دلیل شروع اثر کند این دارو به منظور درمان تنگی نفس حاد استفاده نمی شود و تنها به منظور پیشگیری از آن استفاده می شود.

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام جهت ارتباط @noori_a



نام ژنریک : Cromolin Na

نام تجاری : Intal®

دسته دارویی : ضد آسم و تنگی نفس

دسته فارماکولوژیک / شیمیایی : پایدار کننده غشاء ماست سل ، اثرات ضدالتحابی خود را با مهار واکنش اولیه و تاخیری به آلرژن ها اعمال می کند . از طریق مهار کانال های کلر باعث غشاء ماست سل ها شده ، فعال شدن و آزاد شدن مدياتورهای التحابی را از ادوزینوفیل ها و سلول های اپی تلیال مهار می کند.همچنین پاسخ حاد مجاری هوایی به ورزش ، هوای خشک و سرد و SO₂ را پیشگیری می نماید.

شکل دارویی : قطره چشمی ۲٪ ، Allergocrom® , Opticrom® و Visicrom®.

اسپری بینی ۲٪ Nasocrom® و Cromonase® و Rinomexan®

کپسول استنشاقی Intal® و Cromal®

کاربرد : تنها نقش پیشگیری را در حملات آسم آلرژیک داشته و در درمان حملات جایگاهی ندارد . فاز تاخیری حملات شدید آسم ، جایگزین کورتیکواستروئید ها در آسم اطفال بدلیل اثر سوء آنها در رشد استخوانی ، نقش آن در رینیت آلرژیک در بهبود علائمی مثل خارش ، عطسه و آبریزش (ولی نه احتقان و انسداد بینی) موثر است.

اثر بخشی آن اندک است ، نیمه عمر پایین است و نیازمند مصرف چند بار در روز

داروی بدون عارضه ای است تنها باعث تغییر مزه در دهان می شود. و کمی احساس

سوخستگی و تحریک مخاط

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام جهت ارتباط @noori_a



نام ژنریک: N – Acetyl cysteine

نام تجاری: ACC®, Fluimucil®, Oslyt® و Mucosolin®

دسته دارویی: ضد خلط

دسته فارماکولوژیک / شیمیایی: موکولیتیک با اثرات شکستن پیوند دی سولفیدی مخاط و رقیق کردن آن است و باعث افزایش ذخایر گلوکوتایون می شود. شکل دارویی: قرص معمولی ۲۰۰ میلی گرمی، قرص جوشان ۶۰۰ میلی گرمی و تزریقی ۲ گرمی (Exinac® و Hidonac®)

کاربرد: قرص ها در درمان علامتی سرفه خلط دار استفاده می شود، آنتی دوت استامینوفن، یک آنتی اکسیدان با اثرات نفروپروتکتیو با اثرات نفروپروتکتیو (برای جلوگیری از اثرات نامطلوب سیکلوفسفامید یا مواد حاجب ید دار)، شوک سپتیک، ARDS، دیابت و هرچایی که اکسیداتیو استرس موثر باشد.

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام جهت ارتباط @noori_a

@noori_a




نام ژنریک : Pneumococcal polysaccharide vaccine (23- valent)

نام تجاری : Pneumovax 23

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امک
تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی
جهت ارتباط @noori_a

نام ژنریک : Pneumococcal conjugated vaccine (13- valent)



نام تجاری : prevnar 13

دسته دارویی : واکسن ، غیر فعال شده

شکل دارویی : تزریقی ۰.۵ میلی لیتری

در بارداری رده C است ولی تاکنون هیچ عارضه ای دیده نشده (در حیوان و انسان)
و در شیردهی معلوم نیست که ترشح می شود با احتیاط.

نحوه مصرف :

اینکه کدام نوع ۱۳ و /یا ۲۳ ظرفیتی اندیکاسیون داشته باشد بستگی به شرایط بیمار و
واکسیناسیون پیشین وی دارد که باید به گایدلاین مربوطه مراجعه شود.

در بزرگسالان کل دوز (۰.۵ میلی لیتر) تک دوز به صورت عضلانی (عضله دلتوئید یا
ناحیه لترال و میانه ران)، مطابق دستور العمل تزریق ۲۳ ظرفیتی (حالت های الف تا
پ) در صورت نیاز به تزریق متوالی نوع ۲۳ و النت ، PCV13 می بایست اول تزریق
شود. دوز اضافه به عنوان یادآور توصیه نمی شود.

در افراد پیوندی کل دوز در ۳ دوز (هر دوز ۰.۵ میلی لیتر) که اولین دوز ۳- ۶ ماه
بعد از HSCT و دوز دوم و سوم حداقل با یک ماه فاصله و در نهایت دوز آخر ۶ ماه بعد از
دوز سوم

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت
تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام
جهت ارتباط @noori_a



نام ژنریک : Influenza virus vaccine (inactivated)

نام تجاری : Infuvac, Fluorix, Inflflexal, Fluad, vaxigrip



دسته دارویی : واکسن ، غیر فعال شده

شکل دارویی : تزریقی سرنگ از قبل پر شده ۰.۵ میلی لیتری

این واکسن آنتی ژن های تهیه شده از چهار سویه مختلف ویروس های غیر فعال آنفلوآنزا می باشد که باعث تولید پادتن های خاصی می باشد مصونیت فقط در مقابل آن سویه هایی از ویروس ایجاد می شود که مشابهت نزدیکی با سویه های موجود در واکسن داشته باشند. مصونیت تقریباً ۱۴ روز بعد از تزریق واکسن ایجاد می شود و برای ۶ ماه تا یک سال باقی می ماند.

در صورت حساسیت به تخم مرغ و سابقه سندروم گیلیان باره توصیه نمی شود. بدلیل احتمال بروز تب بعد از تزریق واکسن سابقه تشنج ناشی از تب بررسی شده و از تریق در افراد مبتلا به تب حاد خودداری شود.

منع مصرف در:

افراد دارای سابقه واکنش های آلرژیک شدید (نظیر آنافیلاکسی) به واکسن آنفلوآنزا و یا هر یک از اجزای واکسن

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام جهت ارتباط @noori_a

توجه به میزان دوز واکسن با عنایت به نوع واکسن و توصیه های کارخانه سازنده واکسن، در این گروه سنی الزامی می باشد.

سرماخوردگی و فرآورده های آن :

Tab: Adult Cold

(Acetaminophen + Phenylephrine + Chlorpheniramine)

Tab: Cold Stop or Coldax

(Acetaminophen + Pseudoephedrine + Diphenhydramine)

Tab: Biolenol Cold (day / night) (Acetaminophen + Phenylephrine + Dextromethorphan + Chlorpheniramine)

Tab: Biolenol Cold Forte

به تفاوت دوزهای استامینوفن در فرآورده های مختلف توجه کنید. میزان استامینوفن *adult cold* و *biolenol cold mg 325* است ولی *coldax* و *cold stop mg 500* است.

Tab: Antihistamine Decongestant

(Chlorpheniramine + Pseudoephedrine)

Tab: Naprocold

(Naproxen + Pseudoephedrine)

Tab SR: Cetadine

(Cetirizine + Pseudoephedrine)

استفاده از این جزوه تنها در صورت پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد. در غیر اینصورت تهیه کننده هیچگونه رضایتی نداشته و استفاده از آن قانونی و شرعاً حرام است. آیدی تلگرام جهت ارتباط @noori_a